

# PRELIMINAIRE ENQUEELES GEANTES PRELIMINAIRE OMPHALOCELES OF ANTES

### MR BOUKHRIS, C ROUSSET, R SFEIR, P VAAST, S MUR, N PANAIT, A BENACHI, L STORME

Journée annuelle du centre de référence de la hernie de coupole diaphragmatique

### Contexte

- Les omphalocèles non syndromiques, géantes ou non mais contenant tout ou une partie du foie ont été intégrées dans le périmètre d'expertise du réseau « CRMR de la Hernie de Coupole Diaphragmatique »
- La prise en charge nécessite un travail collectif et collaboratif pour :
  - créer un code Orphanet dédié à cette sous-catégorie d'omphalocèle particulière,
  - rédiger un premier Protocole National de Diagnostic et de Soin,
  - ✓ développer un registre national.

### But de l'enquête

- Avis sur la nomenclature appropriée qui pourrait correspondre à une définition clinique plus précise de cette sous-catégorie d'omphalocèles,
- Estimation du nombre de cas en France,
- Analyse des pratiques cliniques et des protocoles de prise en charge.



## Profil des répondants



Anténatale (9)



Pédiatres (26)

Chirurgiens pédiatres (35)





Seriez-vous d'accord pour appeler une "hépatocèle "une « omphalocèle non syndromique contenant tout ou partie du foie » répondant à la définition clinique suivante :


« Malformation rare, non syndromique, caractérisée par l'absence de fermeture de la paroi abdominale avec extériorisation extra-abdominale partielle ou totale du foie, indépendamment de la taille du défect »







Seriez-vous d'accord pour appeler " hépatocèle " une « omphalocèle non syndromique contenant tout ou partie du foie » répondant à la définition clinique suivante :

« Malformation rare, non syndromique, caractérisée par l'absence de fermeture de la paroi abdominale avec extériorisation extra-abdominale partielle ou totale du foie, indépendamment de la taille du défect »


















De façon générale, en se basant sur les 5 dernières années, combien de dossiers d'« omphalocèle non syndromique contenant tout ou partie du foie » avez-vous eu à étudier au sein du CPDPN de votre Centre / an ?





De façon générale, en se basant sur les 5 dernières années, combien de dossiers d'« omphalocèle non syndromique contenant tout ou partie du foie » avez-vous eu à étudier au sein du CPDPN de votre Centre / an ?








Qui fait l'information des parents dans votre centre ?







### Est-ce que vous rencontrez systématiquement les parents en anténatal dans votre Centre ?
















Est-ce que vous jugez recevable une demande parentale d'une IMG dans le cadre d'une « omphalocèles non syndromiques contenant tout ou partie du foie » ?





# Est-ce que vous jugez recevable une demande parentale d'une IMG dans le cadre d'une « omphalocèles non syndromiques contenant tout ou partie du foie » ?






# ?

Durant ces 5 dernières années, combien d'enfants porteurs d'une « omphalocèle non syndromique contenant tout ou partie du foie » sont nés vivants et pris en charge dans votre Centre ?





# Durant ces 5 dernières années, combien d'enfants porteurs d'une « omphalocèle non syndromique contenant tout ou partie du foie » sont nés vivants et pris en charge dans votre Centre ?








# Quel est dans ce cas la voie d'accouchement préférentielle dans votre centre ?





### Quel est dans ce cas la voie d'accouchement préférentielle dans votre centre ?








Est-ce que vous avez un protocole écrit de prise en charge de ces enfants en période néonatale ?














# Quel est votre stratégie de prise en charge de première intention pour les patients porteurs d'une

« omphalocèle non syndromique contenant tout ou partie du foie » quelle que soit la taille du collet ?





Quel est votre stratégie de prise en charge de première intention pour les patients porteurs d'une « omphalocèle non syndromique contenant tout ou partie du foie » quelle que soit la taille du collet ?








Si vous optez pour une fermeture différée, quel est l'âge moyen (approximativement) de fermeture de la paroi abdominale ?





# Si vous optez pour une fermeture différée, quel est l'âge moyen (approximativement) de fermeture de la paroi abdominale ?







Si vous optez pour une fermeture différée, quels sont vos critères pour choisir le moment de l'intervention ?














Observez-vous parfois une HTAP chez ces enfants?














# A combien estimez-vous le taux de décès dans la première année de vie ?





### A combien estimez-vous le taux de décès dans la première année de vie ?








Pensez-vous que la prise en charge médicale et chirurgicale de ces enfants soulève des questions éthiques ?














### Est-ce que ces enfants bénéficient d'un

suivi particulier?
















- > Suivi essentiellement chirurgical.
- Protocole et programme de suivi élaboré essentiellement par les chirurgiens.
- ➤ Nécessité de mise en place, l'intégration au circuit des HCD permettra de fluidifier le parcours ante et post natal.
- ➤ Prise en charge silo puis fermeture. Recours au tannage exceptionnel.
- ➤ Selon le parcours néonatal suivi calqué sur les hernies diaphragmatiques si HTAP au 1er plan sinon le suivi est plus gastro pédiatre et chirurgical conjoint en CMD.
- Réseau COCON.
- > Suivi en collaboration avec les chirurgiens et gastro pédiatres.






Quel est l'âge moyen de suivi de ces enfants ?









- ✓ Pas de chiffrage disponible à l'instant
- ✓ Nous suivons tous les enfants jusqu'à leur majorité
- ✓ Jusqu'à l'âge adulte
- ✓ On essaie de les suivre jusqu'à l'âge adulte mais il y a des perdus de vue.
- ✓ Je ne comprends pas la question, ils sont suivis toute l'enfance
- ✓ Suivi jusqu'à l'adolescence



# Merci de votre attention

